

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INIEN VERSCHILLENDE

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX Raalte

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
Loughrea, Co. Galway
Ireland

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Wormgranulaat, 222 mg voor kittens en katten.
Fenbendazol

GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per gram:
Werkzaam bestanddeel: Fenbendazol 222 mg

INDICATIES

- Ter bestrijding van infecties met onvolwassen en volwassen stadia van *Toxocara cati*
- Ter bestrijding van infecties met de lintworm *Taenia hydatigena*

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor fenbendazol

BIJWERKINGEN

Geen bekend.

DOELDIERSOORT(EN)

Kat

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE VAN GEBRUIK

Toedieningsweg: Oraal, via het voer of in de bek

Dosering:

- Volwassen katten: 100 mg fenbendazol per kg lichaamsgewicht.
- Kittens tot een leeftijd van zes maanden: 50 mg fenbenzanol per kg lichaamsgewicht gedurende 3 dagen.

Kittens: Gedurende 3 opeenvolgende dagen de hoeveelheden:		Volw. Katten: Per behandeling de hoeveelheden:	
Lichaamsgewicht	Hoeveelheid	Lichaamsgewicht	Hoeveelheid
0.7 - 1.1 kg	1/4 zakje per dag	1.5 - 2.0 kg	1 zakje
1.2 - 2.0 kg	1/2 zakje per dag	2.1 - 3.0 kg	1½ zakje
2.1 - 3.0 kg	3/4 zakje per dag	3.1 - 4.0 kg	2 zakjes
3.1 - 4.3 kg	1 zakje per dag	4.1 - 6.0 kg	3 zakjes
		> 6.0 kg	4 zakjes

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Weeg het dier zorgvuldig voor het bepalen van de juiste dosering.
Meng (niet prakken) de voorgeschreven hoeveelheid bij voorkeur door het nat (blik)voer van uw kat. Stel direct het voer ter beschikking aan de kat.

WACHTTIJD(EN)

Niet van toepassing.

BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren beneden 25 C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren. Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient
Direct contact met de huid zoveel mogelijk vermijden. Handschoenen na toediening. Vermijd de inhalatie van de stof.

Dracht

In verband met mogelijke embryotoxische effecten dient aan het begin van de dracht terughoudendheid met het gebruik van het diergeneesmiddel te worden betracht.

Onverenigbaarheden

Niet mengen met enig ander diergeneesmiddel.

SPECIALE VOORZORGSMATREGELLEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

22 november 2018

OVERIGE INFORMATIE

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
REG NL 9628

KANALISATIE

VRIJ

Spoelwormen: deze wormen komen voor in de darmen van katten. Spoelwormen zijn langwerpige, ronde wormen met spits toelopende uiteinden. De spoelworm komt het meeste voor en is belangrijk om te bestrijden vanwege de schade die deze kan veroorzaken. Niet alleen katten, maar ook mensen, met name kinderen, kunnen last hebben van deze wormen. Katten kunnen besmet raken door het opklippen van eitjes, die in de omgeving voorkomen. Spoelwormen zullen met name bij jonge dieren problemen geven. Met spoelwormen besmette kittens groeien slecht. Ze blijven mager, maar kunnen desondanks een 'dik' buikje hebben. Kittens worden via de moedermelk besmet. Volwassen dieren hebben meestal weinig last van spoelwormen. Meestal is een spoelworminfectie niet herkenbaar en derhalve is het treffen van preventieve maatregelen noodzakelijk.

Spoelwormen kunnen bij jonge dieren snel veel schade aanrichten, daarom is bestrijding bij jonge dieren van groot belang.

Lintwormen: lintwormen zijn in vergelijking met spoelwormen alleen maar hinderlijk. Deze wormen kunnen o.a. worden overgedragen door vlooiën. De lintworm is te herkennen in de ontlasting of rond de anus van de kat als 'rijstekorreltjes' of 'maden'. Dit zijn wormsegmenten die loslaten en meestal met de ontlasting mee naar buiten komen. Deze wormsegmenten zitten vol met lintwormeieren die weer een herbesmetting kunnen veroorzaken. De kat besmet zichzelf weer door het opklippen van de besmette vlooiën.

Behandel dieren direct als wormsegmenten in de ontlasting worden aangetroffen. In geval van een lintworminfectie dient de behandeling altijd na een maand herhaald te worden. Heeft het dier last van vlooiën dan moet behandeling om de 6 weken plaatsvinden, zolang er vlooiën aanwezig zijn. Uiteraard zullen ook de aanwezige vlooiën, -larven en -eitjes in de omgeving van uw huisdier bestreden moeten worden.

Algemeen ontwormadvies

Kittens: behandelen op de leeftijd van 3, 5, 7 en 9 weken, vervolgens maandelijks tot de leeftijd van een half jaar. Daarna op 9 en 12 maanden.

Volwassen katten: minimaal 4 maal per jaar.

Zogende poezen: Tegelijk met de zogende katten; vervolgens minimaal 4 maal per jaar.

Genoemde adviezen zijn in overeenstemming met de Europese ESCCAP richtlijnen.

Wormgranulaat

| Voor kittens en katten

